

# TECHNIKI STOSOWANIA PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW DO DEZYNFEKcji

## ROKAnol P / ROKAnol PW

BROSZURA INSTRUKTAŻOWA

**UŻYWAĆ TYLKO NA OTWARTEJ LUB DOBRZE WENTYLOWANEJ PRZESTRZENI.  
DEZYNFEKcja PRZED WEJŚCIEM DO OBIEKTÓW:**


**AUTOMATYCZNA KOMORA/KURTyna DEZYNFEKcji – ZALECENIA**

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**


### SZKOŁY, UCZELNIE, URZĘDY, SZPITALA



### DWORCE, PORTY LOTNICZE




### OBIEKTY SPORTOWE I KULTURY



### Dezynfekcja okrycia wierzchniego

- Odkazanie odbywa się podczas krótkotrwałego przebywania osoby w automatycznej komorze/kurtynie dezynfekcji.
- Komora/kurtyna w tym czasie rozpyla płyn poprzez wytworzenie mgiełki z preparatu odkazającego.
- W czasie dezynfekcji należy zastąpić oczy.
- Zalecany czas pojedynczego rozpylania **5-15 sekund**. Po przejściu przez komorę/kurtynę, rozpylony produkt odparowuje.
- W przypadku długotrwałego bezpośredniego działania należy stosować rękawice ochronne.



**Nie spożywać posiłków!**



**Nie palić!**



**Nie używać telefonów!**



**Chronić przed dziećmi!**

**Producent ponad 1000 produktów chemicznych i formułacji dla przemysłu**

**[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)**

\* Szczegółowe informacje dotyczące środków ostrożności podczas postugiwania się produktem, wpływu na stan zdrowia, ewentualnych objawów oraz środków pierwszej pomocy znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu.